




asociación
española
contra el cáncer

IMPACTO DEL CÁNCER EN CANTABRIA

2024





Índice

00

Introducción



01

La estructura de población en Cantabria



01.1 Estructura de la población en Cantabria

02

Los números del cáncer en Cantabria



02.1 Datos de incidencia de cáncer en Cantabria

02.2 Datos de mortalidad por cáncer en Cantabria

02.3 Datos de prevalencia de factores de riesgo de cáncer en Cantabria

02.4 Cáncer y aspectos sociales

02.5 Prácticas de prevención secundaria en Cantabria

02.6 Cuidados paliativos en Cantabria

00

Introducción



En el presente documento presentamos el análisis de los aspectos más destacados sobre el cáncer en el **año 2024** en Cantabria. Destacando los siguientes apartados:

■ Incidencia

■ Mortalidad


■ Factores de riesgo

Obesidad, Ejercicio físico, Tabaco, Alcohol


■ Aspectos sociales

Impacto sociolaboral, Soledad

Nuevos casos por Provincia



Número de tipos de cáncer con más incidencias



Incidencia

Corresponde a los nuevos casos detectados de cáncer dentro de un año dado.

La tasa de incidencias

La tasa de incidencias corresponde a los nuevos casos detectados por cada 100.000 habitantes.

Fuentes de datos

Incidencias: GLOBOCAN 2022 Today / Población: Censo de población del INE

Proyección

Los datos extraídos de GLOBOCAN hacen referencia al año 2022. Para el cálculo de años posteriores se aplica la tasa de incidencias para cada tipo de cáncer en el año 2022 a la población de los años posteriores, por cada segmento de población de edad, sexo y provincia.


Incidencias



Tasa de incidencias




Nuevos casos por edad



01

La estructura de población en Cantabria




01.1 Estructura de la población de la comunidad autónoma

La disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida están modificando la estructura de edad de la población. **La esperanza de vida al nacer alcanza los 81,37 años en los hombres y 86,91 en las mujeres de Cantabria**, valores similares a los del resto del país. El porcentaje de personas mayores de 65 años sigue aumentando, acompañado de lo que se ha denominado «envejecimiento del envejecimiento», o aumento del grupo de más de 80 años. Este envejecimiento progresivo de la población aumentará la incidencia y prevalencia de enfermedades como el cáncer, así como la demanda de atención sociosanitaria de las personas dependientes y su entorno; además de un incremento en su nivel de dependencia.

En este sentido, el envejecimiento de la población y la ampliación de la esperanza de vida dan como resultado que los hijos de las personas de la cuarta edad sean población de la tercera edad, que tiene una mayor probabilidad de tener un mayor grado de dependencia que cohortes de edad de la pirámide situados por debajo de estos. La población vive ahora más años, pero también es mucho más dependiente, lo que se traduce en que vivimos más años, pero con una calidad de vida inferior en los últimos años de vida. En definitiva, podemos concluir que la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida están modificando la estructura de edad de la población, así como las pautas culturales con las que concebíamos el envejecimiento.



Estructura de la población

| Sexo | <=14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | >=75 | Total |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Mujeres | 33.681 | 40.748 | 53.446 | 73.488 | 61.401 | 41.765 | 304.529 |
| Hombres | 35.720 | 42.573 | 53.119 | 72.227 | 55.929 | 26.754 | 286.322 |
| Total | 69.401 | 83.321 | 106.565 | 145.715 | 117.330 | 68.519 | 590.851 |



ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN CANTABRIA (II)

Total
591.255



Indicadores demográficos

| Comunidad Autónoma | Superficie (Km2) | Habitantes | Densidad de población (hab/km2) |
|--------------------|------------------|------------|---------------------------------|
| Cantabria | 5.321 | 591.255 | 111,12 |
| España | 505.962 | 48.628.256 | 96,11 |

Mercado de trabajo

| Comunidad Autónoma | Tasa Actividad (%)* | Tasa de paro (%)** |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| Cantabria | 56,90 % | 7,17 % |
| España | 59,04 % | 11,21 % |

* La tasa de actividad está referida a la población activa respecto a la población mayor de 15 años.

** La tasa de paro está referida a los parados en búsqueda activa de empleo, respecto a la población activa.

*** Datos referidos a la EPA del 3er trimestre del año 2024.

Indicadores socioeconómicos

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Renta media por persona | Renta media por hogar | Tasa de riesgo por pobreza | |
| 14.162 € | 33.373 € | 15,2 % | |
| Indicador AROPE | Tamaño medio del hogar | Hogares unipersonales | Hogares de parejas mayores de 65 |
| 22,1 % | 2,36 | 72.819 | 24.170 |


02

Los números del cáncer en Cantabria




02.1 Datos de incidencia de cáncer en Cantabria

Se estima en **3.960** el número de casos nuevos de cáncer, diagnosticados en Cantabria en el año 2024



| Provincia | Nº de casos por 100.000 habitantes |
|-----------|------------------------------------|
| Cantabria | 670 |


Nuevos casos en Cantabria




La tasa bruta de nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes es de 670, superior a la **tasa bruta media del total de España que se sitúa en 597 casos**. Este hecho se debe principalmente al envejecimiento poblacional, donde sabemos que en Cantabria la población está más envejecida que la media nacional, por lo que una mayor proporción de personas mayores en esta comunidad supone un número mayor de diagnósticos de cáncer.

Respecto a la variable edad, detallar que la edad avanzada es el factor de riesgo más importante de cáncer en general y para muchos tipos de cáncer. Así, observamos que el máximo número de diagnósticos se sitúan en los intervalos de edad superiores. **La incidencia se incrementa significativamente en los intervalos superiores de edad, observándose la tasa más elevada en el intervalo de edad de mayores de 75 años.**

Nuevos casos por edad



Tipos de cáncer con más incidencias




Los tipos de cánceres en los que se encuentran una mayor proporción de pacientes diagnosticados en Cantabria son **Colorrectal (14,38 %)**, **Prostata (12,18 %)**, **Mama (12,00 %)**, **Pulmón (10,91 %)** y **Vejiga (7,78 %)**. En la gráfica se detallan los datos de los 5 tipos de tumores en los que se producen un mayor número de casos.

02.2 Datos de mortalidad por cáncer en Cantabria

Se estima en **1.628 el número de defunciones por cáncer en Cantabria en el año 2024. La tasa de mortalidad bruta fue 276 defunciones por cáncer por 100.000 habitantes.**

Fallecidos en Cantabria



Mortalidad




Tasa de mortalidad




La mortalidad por cáncer afecta fundamentalmente a adultos de edad avanzada. Del total de las defunciones, el 79,65 % se produjeron en personas de **65 o más años**.

Fallecidos por edad



Respecto a la mortalidad por tipo de tumor, en la gráfica que se muestra a continuación se detallan los 10 tipos de tumores que provocan un mayor número de defunciones en Cantabria.

10 tipos de tumores que provocan un mayor número de defunciones en Cantabria



02.3.1 Obesidad, sobrepeso y cáncer

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha encontrado suficiente evidencia científica para relacionar numerosos tipos de tumores con la obesidad y el sobrepeso.


Hay pruebas consistentes de que cantidades mayores de grasa corporal están asociadas con mayores riesgos de los cánceres de endometrio, adenocarcinoma de esófago, cáncer gástrico del cardias, cáncer de hígado, cáncer de riñón, mieloma múltiple, meningioma, cáncer de páncreas, cáncer colorrectal, cáncer de vesícula biliar, cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de tiroides.

La obesidad es un problema creciente que ya afecta al 14,92 % de la población en nuestro país, un total de 6.197.754 españoles de todas las edades*.

* Instituto Nacional de Estadística. INE base. Encuesta Europea de Salud de España 2020.


Población según IMC

En Cantabria **66.085 personas tienen problemas de obesidad** (12,86 %) y **190.958 de sobrepeso** (37,15 %).



Población por sexo

La obesidad y el sobrepeso es un problema de salud que afecta en igual medida a hombres y mujeres. Sin embargo, los datos indican que hay una mayor proporción de hombre con sobrepeso que mujeres.




02.3.2 Actividad física y sedentarismo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ejercicio moderado para combatir el riesgo de mortalidad por enfermedades crónicas. La práctica regular de ejercicio físico es una recomendación establecida como parte de un estilo de vida saludable que reduce el riesgo de cáncer y de otras enfermedades, como las enfermedades cardíacas y la diabetes. Desde hace años diferentes estudios han mostrado como la realización de ejercicio previene algunos tipos de cáncer, y es muy eficaz como parte del tratamiento en los supervivientes de esta enfermedad. Numerosos estudios han examinado las asociaciones entre la actividad física y el riesgo de cáncer y han mostrado reducción del riesgo para los cánceres de colon, mama y endometrio. Existe evidencia de los beneficios de la actividad física en disminuir el riesgo de otras localizaciones tumorales.

Observándose las mayores reducciones en adenocarcinoma de esófago, cáncer de hígado, cáncer gástrico, cáncer renal y leucemia mieloide. Mielomas y cánceres de cabeza y cuello, de recto y vejiga mostraron también menor riesgo, aunque las asociaciones no son tan potentes.

Casi 26 millones de españoles mayores de 15 años, indica que realizan algún tipo de actividad física en su tiempo libre. Lo que representa un 63,5% de la población de más de 15 años en nuestro país. Pero aún 15.103.164 no realizan ningún tipo de actividad física.

En Cantabria, hasta 310.355 personas afirma llevar un estilo de vida sedentario, no realizan ningún tipo de actividad física.



02.3.3 Consumo de tabaco



El consumo de tabaco es la principal causa evitable de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo.

El tabaco es el principal factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Los fumadores también tienen mayor riesgo de padecer cáncer de boca, labios, lengua, laringe y faringe, cáncer de estómago, de esófago, de páncreas, de vejiga, de riñón, de cuello de útero, de colon y de recto, de hígado, de mama, de la cavidad nasal, de ovario y ciertas formas de leucemia.

El consumo de tabaco provoca 52.000 muertes anuales en España, un país donde el 22% de la población sigue siendo fumadora. Lo que significa que cerca de 9 millones de españoles son fumadores. El consumo de tabaco en Cantabria se muestra en el siguiente gráfico:

| Fumadores a diario | Fumadores ocasional | Exfumadores | No fumadores |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 95.174 | 4.447 | 116.292 | 295.710 |

- La distribución de fumadores diarios por edad y género se detallan en los siguientes gráficos.
- El número de fumadores diarios en la población mayor de 15 años en Cantabria se detalla en la siguiente gráfica.
- La proporción de población que fuma a diario es un 19% de la población de más de 15 años.



02.3.4 Consumo de alcohol

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de padecer entre otros, cáncer de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrectal y mama. En el caso del cáncer de hígado esta asociación es muy importante sobre todo a través del desarrollo previo de cirrosis hepática.


Respecto al cáncer de mama el interés de esta relación radica en que el consumo de pequeñas cantidades de alcohol (tan sólo 10 gr/día) se asocia con un aumento del riesgo de esta enfermedad, cuando se comparan mujeres bebedoras y no bebedoras.

Si al consumo habitual de bebidas alcohólicas le añadimos el de tabaco, se multiplica el riesgo de padecer algunos de estos cánceres entre 10 y 100 veces respecto a las personas que nunca han fumado ni bebido.


La cantidad ingerida de alcohol unida a una dieta pobre en verduras, hortalizas y fruta, común en los bebedores habituales, desempeña también un papel importante en el aumento del riesgo.

En España, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, un 35,1% de los españoles son consumidores habituales de alcohol. El 24,4% de la mujeres y el 46,3% de los hombres. En Cantabria la proporción de consumidores habituales de alcohol es inferior a la media nacional llegando a un 20,7%. Por sexo, **se observa un consumo inferior a la media nacional en el caso de los varones (29,6%) y muy por debajo de la media del país en el caso de la mujeres (12,4%).**


* Instituto Nacional de Estadística. INE base. Encuesta Europea de Salud en España 2020



% Consumidores por nivel de estudios



% Consumidores por ingresos de hogar



02.4. Cáncer y aspectos sociales

02.4.1 Impacto sociolaboral del cáncer

El diagnóstico de cáncer está asociado a una amenaza para la salud con repercusiones en todas las esferas de la vida de la persona enferma y de sus familiares. Dichas consecuencias se ven significativamente moduladas en función de la situación en la que la persona se encuentra cuando es diagnosticada de cáncer. Sin duda, su situación sociolaboral en el momento del diagnóstico condiciona claramente las consecuencias que la enfermedad va a tener en los diferentes aspectos de su vida; pudiendo resultar este diagnóstico un causante y/o agravante de riesgo socioeconómico para la subsistencia de la persona y su familia.

Así pues, se estima que el 10% de las personas que han sido diagnosticadas de cáncer en España, durante el año 2024, se encontraban en una situación de vulnerabilidad socioeconómica en el momento del diagnóstico, o este ha generado dicha vulnerabilidad con su aparición. La incidencia de cáncer en personas en situación laboral de riesgo en España es de 21.482.

La incidencia de cáncer en personas en situación laboral de riesgo en Cantabria es de 257.

Indicadores sociales

Indicadores sobre cáncer y aspectos sociales

| | |
|---|-----|
| Personas diagnosticadas en situación de desempleo | 70 |
| Personas trabajadoras por cuenta propia diagnosticadas con cáncer | 187 |

02.4.2 Soledad y cáncer

La soledad se ha convertido en uno de los principales desafíos de las sociedades occidentales. En las bases de la soledad encontramos numerosas razones, pero podemos destacar los recientes cambios demográficos y factores sociales como especialmente relevantes. Los cambios demográficos son consecuencia de dos hechos clave, como son el decremento de las tasas de natalidad y el incremento de la esperanza de vida. En el contexto social, factores como el surgimiento de nuevos modelos familiares, crisis en los sistemas de cuidados, la desprotección familiar y las dificultades para conciliar vida familiar y laboral.

La soledad es un problema relevante para toda la población, especialmente para las personas mayores. Según la Encuesta Continua de Hogares del INE el número de hogares unipersonales alcanza los 5.160.382 como valor medio de 2024, lo que supone el 27,4% del total de hogares. Por otra parte, 1.909.108 (un 10,1% de todos los hogares) tenían 65 o más años.

Muchas personas que son diagnosticadas de cáncer viven solas. Se estima que alrededor de 49.864 personas que viven solas son diagnosticadas de cáncer cada año. El colectivo que más crece entre las personas que viven en hogares unipersonales es el de las mujeres mayores de 65 años con diagnóstico de cáncer. A este dato se suma el importante número de hogares en los que conviven una pareja mayor de 65 años en los que uno de los miembros recibe un diagnóstico del cáncer. Concretamente, un total 72.365 hogares en España.

En Cantabria, se estima que 730 personas diagnosticadas de cáncer cada año viven solas. A ellos, se suman 909 nuevos diagnósticos en parejas mayores de 65 años.

| | |
|---------------------------|---|
| Pacientes que viven solos | Pacientes viven solos por cada 100.000 habitantes |
| 730 | 124 |

02.5 Prácticas de prevención secundaria

02.5.1 Detección de sangre oculta en heces

La prueba de sangre oculta en heces es la principal prueba para la detección precoz del cáncer de colon. En los gráficos inferiores podemos ver el porcentaje de la población de entre 50 y 69 años que se ha realizado alguna vez la prueba por sexo, edad y comunidad autónoma de residencia. En los últimos años se ha ido incorporando progresivamente a los programas de cribado poblacional de las distintas comunidades autónomas, pero como podemos ver, la implementación de la misma está lejos de ser universal si atendemos al porcentaje de personas en la edad objetivo que se han realizado la prueba alguna vez.

% Personas (entre 50-69) que se han realizado una prueba de sangre en heces los últimos 2 años

40,2 %


% En hombres (50-69 años)

37,5 %


% En mujeres (50-69 años)

42,6 %


Porcentaje de personas de entre 50 y 69 años que nunca se han realizado una prueba de Sangre Oculta En Heces (SOEH), por CCAA



Última prueba realizada



% Pruebas por edad



*Instituto Nacional de Estadística. INE base. Encuesta Europea de Salud en España 2020.

02.6 Cuidados paliativos en Cantabria

02.6.1 Recursos asistenciales de cuidados paliativos

La primera condición para estar bien atendido en la fase final de la vida es disponer de servicios sanitarios que presten la asistencia que se necesita; en este caso, unidades de cuidados paliativos. Según la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC por su siglas en inglés) **el número óptimo de recursos especializados de cuidados paliativos para una atención adecuada es de 2 por cada 100.000 habitantes**, uno de atención en el domicilio y otro de atención hospitalaria.


Atendiendo a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y al equipo ATLANTES del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, en España contamos con un total de 201 recursos asistenciales de Cuidados Paliativos que cumplen completamente con los criterios establecidos por la SECPAL (con datos del Geodirectorio de recursos de cuidados paliativos, en su última actualización de diciembre de 2017). Además, se han localizado otros 130 recursos asistenciales sin clasificar (cumplen solo parcialmente los criterios SECPAL) y de 50 recursos no asistenciales (asociaciones, centros de investigación, etc.). Estos 331 recursos asistenciales implican una tasa para el total de España de 0,7 recursos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del óptimo. En el caso de Cantabria, se han detectado un total de 5 recursos asistenciales, siendo la tasa por cada 100.000 habitantes de 0,86.

| Recursos asistenciales clasificados en Cantabria | Otros recursos asistenciales en Cantabria | Recursos asistenciales totales en Cantabria | Tasa de recursos asistenciales por cada 100.000 habitantes |
|--|---|---|--|
| 4 | 1 | 5 | 0,86 |

02.6.2 Población con potenciales necesidades paliativas

Siguiendo los últimos datos oficiales disponibles por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 en España fallecieron un total de 493.776 personas. De ellas, y siguiendo los criterios de la especialista australiana en cuidados paliativos Beverley McNamara, **183.119 (un 37,1%) eran personas que fallecieron siendo potenciales beneficiarios de cuidados paliativos**. Además, sabemos que, de esas personas, **el 61,6% eran pacientes oncológicos**.


En el caso de Cantabria, el número de personas con potenciales necesidades paliativas fallecidas en el año 2020 sería de 2.635, de las cuales el 63,6% serían pacientes oncológicos.



02.6.3 Lugar de fallecimiento de la población oncológica

El lugar del fallecimiento de una persona con una enfermedad en fase terminal, y si este es acorde a sus deseos, es **uno de los principales indicadores de calidad de un sistema de cuidados paliativos y acompañamiento al final de la vida**. En Europa, gracias a un estudio realizado en siete países, sabemos que la opción deseada por la amplia mayoría de los pacientes es la de fallecer en su domicilio (siendo la opción más deseada en España por el 66% de las personas). Pese a ello, la gran mayoría de los fallecimientos se producen en el contexto hospitalario.

No obstante, según los últimos datos disponibles para el año 2020, sólo el 31,6% de las personas que han fallecido de cáncer en España lo hacen en su domicilio. Este porcentaje es del 37,5% en Cantabria.







IMPACTO DEL
CÁNCER
EN CANTABRIA



2024